

# ZABIEG KOLONOSKOPII

DATA BADANIA:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
dzień		miesiąc		rok		

GODZINA BADANIA:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------

MIEJSCE BADANIA (szpital/zakład opieki zdrowotnej):

.....

.....

.....

.....

**PRZYGOTOWANIE  
DO BADANIA**

## DIETA

### 2-3 DNI PRZED BADANIEM

Zalecane jest spożywanie produktów ubogich w błonnik. Dopuszczalne jest spożywanie kisielików, kleików, ryżu, makaronów, gotowanych ziemniaków bez skóry i pomidorów bez skóry. Zaleca się spożywanie niegotowanych mięs i ryb. Dopuszczalne są także soki owocowe, miód, herbata, kawa bez dodatku mleka, oraz czyste zupy i rosół.

Należy unikać: produktów spożywczych bogatych w błonnik, np. pełnoziarnistego, brązowego chleba i innych produktów, które zawierają ziarna zbóż. Niedozwolone jest spożywanie tłustych mięs i wędlin oraz warzyw i owoców pestkowych.



### 24 GODZINY PRZED BADANIEM

Przeznaczona musi być dieta płynna lub półpłynna!

Dopuszczalne jest spożywanie płynów w postaci soków owocowych, wody mineralnej, lemoniady, kawy bez dodatku mleka, czystych zup i rosół. Dozwolone jest także ssanie cukierków miętowych i jedzenie miodu.



### W DNIU BADANIA

Do czasu badania nie wolno spożywać pokarmów!

Do czterech godzin przed badaniem (jeżeli nie planowane jest znieczulenie ogólne) dopuszcza się picie do 500 ml płynów niegazowanych i klarownych. Klarowny płyn to: woda, sok owocowy bez miąższu, herbata. W przypadku planowanego znieczulenia ogólnego w dniu badania należy powstrzymać się od przyjmowania płynów doustnych. W dniu badania proszę zabrać ze sobą okulary oraz ewentualną dokumentację medyczną z poprzednich badań.




# PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU KOLONOSKOPII Z UŻYCIEM PRODUKTU LECZNICZEGO MOVIPREP®

Informacja przeznaczona tylko dla pacjentów, którym zalecono oczyszczenie jelita przed zabiegiem kolonoskopii przy użyciu leku MOVIPREP®

MATERIAŁ EDUKACYJNY DLA PACJENTA

## SCHEMAT JEDNODNIOWY - spożycie dwóch litrów roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym badanie

<b>DZIEŃ PRZED BADANIEM</b> wieczór  <b>2 Litry</b>	<b>DZIEŃ BADANIA</b>  rano <b>BADANIE</b>
---	---




Pacjent powinien się starać wypić pełną szklankę roztworu co 10-15 minut. W czasie stosowania leku Moviprep zaleca się wypicie dodatkowo jeszcze jednego litra wody, aby zapobiec uczuciu pragnienia i odwodnieniu.

### POWTÓRZYĆ KROKI W CELU SPORZĄDZENIA DRUGIEJ DAWKI LEKU

## SCHEMAT PODZIELONY - spożycie 1 litra roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym badanie oraz drugiego litra roztworu rano w dniu badania

<b>DZIEŃ PRZED BADANIEM</b> wieczór  <b>1 Litr</b>	<b>DZIEŃ BADANIA</b> <b>1 Litr</b>  rano	<b>DZIEŃ BADANIA</b> <b>BADANIE</b>  południe
--	--	--



Pacjent powinien się starać wypić pełną szklankę roztworu co 10-15 minut. W czasie stosowania leku Moviprep zaleca się wypicie dodatkowo jeszcze jednego litra wody, aby zapobiec uczuciu pragnienia i odwodnieniu.

### DRUGĄ DAWKĘ LEKU SPORZĄDZONĄ W TAKI SAM SPOSÓB SPOŻYĆ RANO W DNIU BADANIA

**Ważne!** Nie wolno przyjmować żadnych pokarmów stałych od chwili rozpoczęcia przyjmowania leku MOVIPREP® do chwili zakończenia badania.

 **VALEANT**  
Farmaceutyczny i diagnostyczny, sp. z o.o.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego MOVIPREP®. Data zatwierdzenia 23.11.2011 r.